



Boletim Mensal da Qualidade do Ar para o Estado de São Paulo – Ano 6 – N° 10

Outubro de 2025

Boletim Mensal da Qualidade do Ar para o Estado de São Paulo

Ano 6 – Nº 10 – Outubro 2025

Poluição e Saúde

A poluição do ar é um dos mais significantes impactos causados pela atividade humana.

Mesmo com a crescente melhoria na qualidade do ar, o peso das doenças relacionadas com este tipo de poluição aumenta à medida que as populações crescem, envelhecem e se tornam mais suscetíveis a doenças relacionadas com o problema.

A poluição do ar é um fenômeno tipicamente urbano industrial.

Industrial visto que as indústrias, via de regra, emitem poluentes à atmosfera.

Urbano principalmente devido à necessidade de deslocamento de grande número de pessoas, são utilizados vários meios de transporte, a maioria dos quais lança poluentes à atmosfera.

População do Estado em 2023

Número de habitantes

Até 100.000 = 567 municípios

De 100.000 a 400.000 = 63 municípios

De 400.000 a 1.000.000 = 12 municípios

Acima de 1.000.000 = 3 municípios

Total do Estado = 645 municípios com 44.411.238 hab.

Região Metropolitana de São Paulo (RMSP) = 39 municípios com 20.731.920 hab.

São Paulo Capital = 11.451.999 hab.

Fonte: IBGE - censo demográfico de 2022 em 22/12/2023.

Qualidade do ar e efeitos à saúde

Os efeitos à saúde dependem do tipo de poluente e dos níveis dos mesmos na atmosfera.

Na tabela a seguir estão apresentados os efeitos a saúde relacionados à classificação da qualidade do ar para exposição de curto prazo.

Classificação da qualidade do ar e efeitos à saúde – Exposição de curto prazo		
Qualidade	Índice	Significado
N1 - BOA	0 - 40	
N2 – MODERADA	41-80	Pessoas de grupos sensíveis (crianças, idosos e pessoas com doenças respiratórias e cardíacas) podem apresentar sintomas como tosse seca e cansaço. A população, em geral, não é afetada.
N3 – RUIM	81-120	Toda a população pode apresentar sintomas como tosse seca, cansaço, ardor nos olhos, nariz e garganta. Pessoas de grupos sensíveis (crianças, idosos e pessoas com doenças respiratórias e cardíacas) podem apresentar efeitos mais sérios na saúde.
N4 – MUITO RUIM	121-200	Toda a população pode apresentar agravamento dos sintomas como tosse seca, cansaço, ardor nos olhos, nariz e garganta e ainda falta de ar e respiração ofegante. Efeitos ainda mais graves à saúde de grupos sensíveis (crianças, idosos e pessoas com doenças respiratórias e cardíacas).
N5 – PÉSSIMA	>200	Toda a população pode apresentar sérios riscos de manifestações de doenças respiratórias e cardiovasculares. Aumento de mortes prematuras em pessoas de grupos sensíveis.

A qualificação da qualidade do ar está vinculada à norma legal e independe do padrão de qualidade/meta intermediária em vigor, visto que está associada aos efeitos à saúde humana.

Redes de Medição da Qualidade do Ar

A REDE - O conjunto de equipamentos de medição de qualidade do ar colocados em várias cidades e em locais específicos de cidades paulistas é chamado de “Rede de Monitoramento”. São dois os objetivos principais que a CETESB tem ao operar esta rede. Um deles é a verificação das concentrações de poluentes que a população respira e, portanto, se sua saúde está sendo afetada. O outro é permitir a análise dos dados históricos, obtidos ao longo dos anos, de modo a orientar as ações de controle. O diagnóstico feito pela CETESB é baseado na medição de poluentes e de variáveis meteorológicas, efetuada em diversos tipos de equipamentos. São gerados mensalmente cerca de 500.000 dados nas diferentes redes existentes.

POLUENTES - Cada poluente é monitorado por um equipamento específico. Na denominada **REDE AUTOMÁTICA**, o ar é amostrado, analisado e, em tempo real, os dados são enviados à central alocada na sede da CETESB. Ocorre a divulgação em tempo real à população. Há também estações que possuem equipamentos que coletam amostras que são enviadas a laboratório da CETESB para análise e constituem a denominada **REDE MANUAL**.

METEOROLOGIA - Também faz parte da rede a obtenção de dados meteorológicos visto que a concentração dos poluentes é afetada não só pelos poluentes ali lançados mas também pelo grau de dispersão das substâncias liberadas ao ambiente, destacando-se como agentes importantes os ventos, a chuva e a inversão térmica de baixa altitude.

POPULAÇÃO ATENDIDA - As estações são distribuídas de acordo com o conceito de que a poluição do ar é um fenômeno urbano/industrial. Cidades populosas ou de alta industrialização recebem prioritariamente equipamentos. A racionalização de instalações leva a verificar a qualidade do ar apenas onde há indícios de emissão significativa de poluentes, uma vez que tanto a rede automática como a rede manual envolvem uma soma expressiva de recursos, tanto em sua aquisição como na operação.

Cidades monitoradas pela CETESB	Número de estações (manuais e automáticas)	População atendida	% do Estado
42	84	25,1 milhões	57%

Fonte: IBGE - censo demográfico de 2022 em 22/12/2023

(<https://www.ibge.gov.br/estatisticas/sociais/populacao/22827-censo-demografico-2022.html?edicao=37225&t=resultados>)

Dados de Qualidade do Ar do Mês

Este **BOLETIM** apresenta um resumo dos dados obtidos no mês. Os dados são apresentados de acordo com as redes que os geram. Os produzidos pela rede automática, por serem contínuos, são apresentados com associação aos efeitos à saúde (vide item Poluição e Saúde). Já nos gerados em equipamentos manuais, as amostragens são feitas a cada 6 dias, frequência que possui bastante aderência estatística com média anual, mas não possuem significado maior em termos de caracterizar o mês completo a partir de apenas 5 dados. Por essa razão, para este tipo de medição são apresentados os dados de concentração diretamente, sem qualificação de qualidade do ar.

Atenção ao título das tabelas que contém a informação das médias consideradas, por ser esse o critério de saúde. Assim considera-se para todos os particulados e dióxido de enxofre a média de 24 horas, para monóxido de carbono e ozônio, média máxima de oito horas no dia, e para dióxido de nitrogênio a máxima horária observada no dia.

Meteorologia e Poluição no Mês

Em outubro, os acumulados de chuva ficaram abaixo ou próximo das respectivas normais climatológicas na maioria das regiões do estado, com exceção do litoral, extremo sul e centro-oeste. A maioria das chuvas foi ocasionada por áreas de instabilidade continentais ou pela passagem de frentes frias pelo litoral paulista. Essas chuvas prenunciam o início do período mais chuvoso no estado de São Paulo.

As médias das temperaturas máximas ficaram abaixo ou próximas das médias climatológicas na maioria das regiões do estado, com exceção das regiões noroeste e norte, indicando uma provável situação associada ao estabelecimento da fase fria (La Niña) do fenômeno ENSO (El Niño-Southern Oscillation). Na primeira quinzena e no final do mês, massas de ar quente e seco atuaram principalmente sobre o interior do estado, enquanto a faixa leste permaneceu sob atuação de áreas de instabilidade associadas a passagens de frentes frias. Algumas dessas frentes permaneceram atuando por alguns dias no litoral, mantendo as temperaturas mais amenas nessa região. Na segunda quinzena, entre os dias 18 e 22, houve predomínio de uma massa de ar frio sobre todo o estado, que manteve a temperatura amena por todas as regiões. Essas situações meteorológicas influenciaram nas condições de dispersão dos poluentes.


Neste mês, houve cinco dias de ocorrência de níveis elevados de ozônio em todo o estado, sendo registrada a qualidade do ar RUIM em várias estações da RMSP, além de MUITO RUIM na estação Mooca. No interior foram registradas qualidade RUIM nas estações Americana, Araraquara, Bauru, Campinas-Taquaral, Jundiaí, Piracicaba e Taubaté.

Quanto ao material particulado, a qualidade do ar se manteve entre BOA e MODERADA nas estações da RMSP, do interior e do litoral. No entanto, foram observados ainda três dias com qualidade RUIM por MP₁₀ na estação Santa Gertrudes, no interior.

Na estação Cubatão-Vila Parisi foram registrados três dias com qualidade RUIM por MP₁₀ e um dia com qualidade MUITO RUIM por esse poluente. Essa estação registrou ainda quatro dias com qualidade RUIM por SO₂.

Para os demais poluentes, a qualidade do ar se manteve predominantemente BOA.

Ozônio - O₃



O ozônio é um poluente que não é emitido diretamente na atmosfera por nenhuma fonte, mas formado através da reação entre os óxidos de nitrogênio (emitidos por processos de combustão - veicular e industrial) e dos compostos orgânicos voláteis (emitidos em processos evaporativos, queima incompleta de combustíveis automotivos e em processos industriais), na presença de luz solar.

Historicamente as concentrações mais elevadas ocorrem com maior frequência no período de primavera/verão, época em que a incidência da radiação solar é mais intensa e as temperaturas são mais elevadas.

O comportamento do ozônio é apresentado em percentagem de dias que a concentração se situa em cada uma das faixas que são associadas a índices que refletem critérios de efeitos na saúde.

Ozônio (O ₃) - Outubro 2025							
Estação	Qualidade e faixa de concentração (Máxima média móvel de 8h)					N	Repr.
	Boa 0 - 100 µg/m ³	Moderada >100 - 130 µg/m ³	Ruim >130 - 160 µg/m ³	Muito Ruim >160 - 200 µg/m ³	Péssima >200 µg/m ³		
RMSP	Capão Redondo	81%	16%	3%			31 S
	Carapicuíba	94%	6%				31 S
	Cid. Universitária-USP-Ipen	84%	13%	3%			31 S
	Diadema	100%					1 N
	Grajaú-Parelheiros	94%	3%	3%			29 S
	Guarulhos-Paço Municipal	84%	16%				31 S
	Guarulhos-Pimentas	94%	6%				31 S
	Ibirapuera	81%	16%	3%			31 S
	Interlagos	87%	13%				31 S
	Itaim Paulista	100%					31 S
	Itaquera	81%	16%	3%			28 S
	Mauá	81%	16%	3%			31 S
	Mooca	81%	16%		3%		31 S
	Nossa Senhora do Ó	90%	7%	3%			31 S
	Parque D. Pedro II	87%	10%	3%			30 S
	Perus	81%	16%	3%			31 S
	Pico do Jaraguá	81%	16%	3%			30 S
	Pinheiros	97%	3%				31 S
	S. André-Capuava	100%					31 S
	S. Bernardo-Centro	81%	16%	3%			31 S
	Santana	97%		3%			31 S
	Santo Amaro	87%	10%	3%			31 S
	São Caetano do Sul*	-	-	-	-	-	-

N = Número de dias válidos

Repr. = Atende ao critério de representatividade mensal dos dados : S (sim) e N (não)


* Dados indisponíveis devido a questões operacionais

Ozônio (O ₃) - Outubro 2025							
Estação	Qualidade e faixa de concentração (Máxima média móvel de 8h)					N	Repr.
	Boa 0 - 100 µg/m ³	Moderada >100 - 130 µg/m ³	Ruim >130 - 160 µg/m ³	Muito Ruim >160 - 200 µg/m ³	Péssima >200 µg/m ³		
Interior e Litoral do Estado	Americana	68%	19%	13%			31 S
	Araçatuba	87%	13%				31 S
	Araraquara	68%	26%	6%			31 S
	Bauru	68%	26%	6%			31 S
	Campinas-Taquaral	84%	13%	3%			31 S
	Campinas-V.União	94%	6%				31 S
	Catanduva	87%	13%				31 S
	Cubatão-Centro	100%					31 S
	Cubatão-Vale do Mogi	97%	3%				30 S
	Guaratinguetá	97%	3%				31 S
	Jacareí	84%	16%				28 S
	Jaú	84%	16%				31 S
	Jundiaí	71%	23%	6%			31 S
	Limeira	84%	16%				31 S
	Marília	77%	23%				31 S
	Paulínia	87%	13%				31 S
	Paulínia-Sta Terezinha	88%	12%				24 S
	Piracicaba	61%	26%	13%			31 S
	Presidente Prudente	84%	16%				31 S
	Ribeirão Preto	84%	16%				30 S
	Rio Claro-Jd.Guanabara	90%	10%				31 S
	S.José Campos	90%	10%				30 S
	S.José Campos-Jd.Satélite	87%	13%				31 S
	Santos	100%					31 S
	Santos-Ponta da Praia	100%					31 S
	São José do Rio Preto	63%	37%				7 N
	São Sebastião	100%					27 S
	Sorocaba	100%					31 S
	Tatuí	71%	29%				31 S
	Taubaté	90%	7%	3%			31 S

N = Número de dias válidos

Repr. = Atende ao critério de representatividade mensal dos dados : S (sim) e N (não)

Material Particulado



Constituído de partículas sólidas ou líquidas, pequenas o suficiente para se manterem suspensas no ar. Sem característica química definida, tem importância também pelo tamanho que se apresenta. Destacam-se em termos de saúde as partículas menores que 10 micra, chamadas de partículas inaláveis - **MP₁₀** e também as menores que 2,5 micra, chamadas de partículas inaláveis finas - **MP_{2,5}**. As fontes de emissão de material particulado para a atmosfera são os processos de combustão de veículos, principalmente os movidos a diesel, processos industriais, solo ressuspensos, além de partículas que se formam na atmosfera pela reação de gases (partículas ou aerossóis secundários).

Resultados MP₁₀

Rede Automática

A apresentação dos dados é feita em percentagem de dias que a concentração se situa em cada uma das faixas que são associadas a índices que refletem critérios de efeitos na saúde.

Partículas Inaláveis (MP ₁₀) - Outubro 2025								
Estação	Qualidade e faixa de concentração (média de 24h)					Conc. Média Mensal ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	N	Repr.
	Boa 0 - 50 $\mu\text{g}/\text{m}^3$	Moderada >50 - 100 $\mu\text{g}/\text{m}^3$	Ruim >100 - 150 $\mu\text{g}/\text{m}^3$	Muito Ruim >150 - 250 $\mu\text{g}/\text{m}^3$	Péssima >250 $\mu\text{g}/\text{m}^3$			
RMSP	Cerqueira César	100%				23	28	S
	Congonhas	100%				27	30	S
	Diadema	100%				24	1	N
	Grajaú-Parelheiros	97%	3%			23	30	S
	Guarulhos-Paço Municipal	100%				24	31	S
	Guarulhos-Pimentas	100%				23	31	S
	Itaim Paulista	100%				21	31	S
	Marg.Tietê-Ponte dos Remédios	97%	3%			28	29	S
	Mauá	94%	6%			22	31	S
	Osasco	95%	5%			32	22	S
	Parque D.Pedro II	97%	3%			25	31	S
	Perus	93%	7%			31	30	S
	Pinheiros	100%				21	30	S
	S.André-Capuava	97%	3%			24	31	S
	S.Bernardo-Paulicéia*	-	-	-	-	-	-	-
	São Caetano do Sul*	-	-	-	-	-	-	-

N = Número de dias válidos

Repr. = Atende ao critério de representatividade mensal dos dados : S (sim) e N (não)

* Dados indisponíveis devido a questões operacionais

Partículas Inaláveis (MP₁₀) - Outubro 2025								
Estação	Qualidade e faixa de concentração (média de 24h)					Conc. Média Mensal ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	N	Repr.
	Boa 0 - 50 $\mu\text{g}/\text{m}^3$	Moderada >50 - 100 $\mu\text{g}/\text{m}^3$	Ruim >100 - 150 $\mu\text{g}/\text{m}^3$	Muito Ruim >150 - 250 $\mu\text{g}/\text{m}^3$	Péssima >250 $\mu\text{g}/\text{m}^3$			
Interior e Litoral do Estado	Americana	90%	10%			30	31	S
	Araçatuba	77%	23%			34	30	S
	Araraquara	90%	10%			29	30	S
	Bauru	94%	6%			26	31	S
	Campinas-Centro	100%				28	15	N
	Campinas-Taquaral	100%				19	30	S
	Catanduva	71%	29%			46	31	S
	Cubatão-Centro	100%				18	31	S
	Cubatão-Vale do Mogi	94%	6%			30	31	S
	Cubatão-Vila Parisi	39%	48%	10%	3%	65	31	S
	Guaratinguetá*	-	-	-	-	-	-	-
	Jacareí	100%				21	14	N
	Jaú	97%	3%			26	31	S
	Jundiaí	100%				20	31	S
	Limeira	87%	13%			31	31	S
	Marília	94%	6%			24	31	S
	Paulínia	100%				25	31	S
	Paulínia-Sta Terezinha	84%	16%			33	25	S
	Piracicaba	83%	17%			32	24	S
	Presidente Prudente	94%	6%			27	31	S
	Ribeirão Preto	73%	27%			39	30	S
	Rio Claro-Jd.Guanabara	77%	23%			39	31	S
	S.José Campos	100%				19	29	S
	S.José Campos-Jd.Satélite	100%				17	31	S
	Santa Gertrudes	42%	48%	10%		60	31	S
	Santos	100%				22	31	S
	Santos-Ponta da Praia	97%	3%			26	31	S
	São José do Rio Preto		100%			71	7	N
	São Sebastião	93%	7%			29	15	N
	Sorocaba	100%				18	31	S
	Tatuí	97%	3%			20	31	S
	Taubaté	100%				19	29	S

N = Número de dias válidos

Repr. = Atende ao critério de representatividade mensal dos dados : S (sim) e N (não)

* Dados indisponíveis devido a questões operacionais

Rede Manual

São apresentados os dados de concentração obtidos a cada 6 dias.

		Partículas Inaláveis (MP ₁₀) - Outubro/2025				
Estação		Concentração média de 24h (µg/m ³)				
		03/out	09/out	15/out	21/out	27/out
Interior do Estado	Cordeirópolis - Módolo	74	22	38	22	64
	Franca - Cidade Nova	34	19	22	15	-
	Guarujá - Vicente de Carvalho	43	11	31	17	35
	Jaboticabal - Jd Kennedy	62	44	-	29	-
	Santa Gertrudes - Jd. Luciana	65	38	61	33	81

- amostragem inválida ou ausência de dados

Resultados MP_{2,5}

Rede Automática

Assim como os dados de MP₁₀ obtidos automaticamente, os dados de MP_{2,5} são apresentados por faixas de concentração associadas a critérios de saúde.

Partículas Inaláveis Finas (MP _{2,5}) - Outubro 2025								
Estação	Qualidade e faixa de concentração (média de 24h)					Conc. Média Mensal ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	N	Repr.
	Boa 0 - 25 $\mu\text{g}/\text{m}^3$	Moderada >25 - 50 $\mu\text{g}/\text{m}^3$	Ruim >50 - 75 $\mu\text{g}/\text{m}^3$	Muito Ruim >75 - 125 $\mu\text{g}/\text{m}^3$	Péssima >125 $\mu\text{g}/\text{m}^3$			
RMSP	Capão Redondo	93%	7%				14	S
	Carapicuíba	100%					11	S
	Cerqueira César	93%	7%				14	S
	Cid. Universitária-USP-Ipen	100%					8	S
	Congonhas	100%					15	S
	Grajaú-Parelheiros	97%	3%				12	S
	Guarulhos-Paço Municipal	94%	6%				15	S
	Guarulhos-Pimentas	100%					11	S
	Ibirapuera	100%					12	S
	Interlagos	100%					12	S
	Itaim Paulista	97%	3%				12	S
	Itaquera	96%	4%				13	S
	Marg. Tietê-Ponte dos Remédios	87%	13%				17	S
	Mauá	100%					9	N
	Mooca	97%	3%				12	S
	Nossa Senhora do Ó	94%	6%				13	S
	Osasco	96%	4%				15	S
	Parque D. Pedro II	100%					7	S
	Perus	95%	5%				15	S
	Pico do Jaraguá	100%					10	S
	Pinheiros	100%					12	S
	S.Bernardo-Centro	97%	3%				12	S
	Santana	89%	11%				14	S
	Santo Amaro	100%					12	S
	São Caetano do Sul*	-	-	-	-		-	-
	Taboão da Serra	71%	29%				20	S
Interior e Litoral do Estado	Bauru	90%	10%				13	S
	Campinas-V.União	100%					13	S
	Cubatão-Centro	100%					9	S
	Guaratinguetá	100%					10	S
	Jundiaí	100%					13	S
	Limeira	97%	3%				13	S
	Paulínia-Sta Terezinha	96%	4%				15	S
	Piracicaba	100%					12	S
	Presidente Prudente	100%					10	S
	Ribeirão Preto	93%	7%				15	S
	Rio Claro-Jd.Guanabara	90%	10%				16	S
	S.José Campos-Jd.Satélite	100%					10	N
	Santa Gertrudes*	-	-	-	-		-	-
	Santos-Ponta da Praia	100%					9	S
	São José do Rio Preto	43%	57%				25	N
	São Sebastião	100%					7	N
	Taubaté	96%	4%				11	S

N = Número de dias válidos

Repr. = Atende ao critério de representatividade mensal dos dados : S (sim) e N (não)

* Dados indisponíveis devido a questões operacionais

Rede Manual

São apresentados os dados de concentração obtidos a cada 6 dias.

Partículas Inaláveis Finas (MP _{2,5}) - Outubro/2025						
Estação		Concentração média de 24h (µg/m ³)				
		03/out	09/out	15/out	21/out	27/out
RMSP	Santo Amaro	16	4	10	7	16
	Santo André - Capuava	21	4	8	5	22

Resultados Fumaça

Parâmetro histórico. Um bom indicador dos processos de combustão na composição da poluição atmosférica. Medido uma vez a cada 6 dias, e por essa razão são apresentados os valores de concentração.

Fumaça (FMC) - Outubro/2025						
Estação		Concentração média de 24h (µg/m ³)				
		03/out	09/out	15/out	21/out	27/out
RMSP	Cerqueira César	13	6	4	4	11
	Ibirapuera	-	4	4	3	11
	Pinheiros	10	4	5	<3	11
	Tatuapé	11	7	6	6	12
Interior do Estado	Itú	11	5	7	3	10
	Jundiaí	13	7	6	4	15
	Salto	-	-	9	4	10
	Sorocaba	9	6	10	5	9

- amostragem inválida ou ausência de dados


Resultados PTS

As Partículas Totais em Suspensão expressam as medições do conjunto das partículas que se mantém suspensas na atmosfera, desde as menores que 10 µm (MP₁₀ e MP_{2,5}) até as com cerca de 50 µm. Embora uma parte destas partículas seja inalável, são medidas principalmente para se avaliar o grau de sujidade presente em áreas específicas.

Partículas Totais em Suspensão (PTS) - Outubro/2025						
Estação		Concentração média de 24h (µg/m ³)				
		03/out	09/out	15/out	21/out	27/out
RMSP	Cerqueira César	73	35	45	31	47
	Osasco	99	54	65	59	70
	Pinheiros	65	15	41	29	51
	Santo Amaro	68	19	35	27	44
	Santo André - Capuava	77	23	35	26	45
	São Bernardo do Campo	-	-	-	-	-
LITORAL	Cubatão - Vila Parisi	215	-	128	188	-

- amostragem inválida ou ausência de dados

Monóxido de carbono - CO



É um gás incolor e inodoro. Emitido em processos de combustão. Os veículos são responsáveis por cerca de 95% das emissões na RMSP.

Todos os resultados obtidos nas estações medidoras respeitam os padrões qualidade do ar desde 2008.


Monóxido de Carbono (CO) - Outubro 2025							
Estação	Qualidade e faixa de concentração (máxima média móvel de 8h)					N	Repr.
	Boa 0 - 9 ppm	Moderada >9 - 11 ppm	Ruim >11 - 13 ppm	Muito Ruim >13 - 15 ppm	Péssima >15 ppm		
RMSP	Carapicuíba	100%				31	S
	Cerqueira César	100%				29	S
	Congonhas	100%				30	S
	Grajaú-Parelheiros	100%				20	N
	Guarulhos-Pimentas	100%				22	S
	Ibirapuera	100%				30	S
	Marg.Tietê-Ponte dos Remédios	100%				29	S
	Mooca	100%				30	S
	Osasco	100%				22	S
	Parque D.Pedro II	100%				30	S
	Pinheiros	100%				29	S
	S.Bernardo-Centro	100%				31	S
	Santo Amaro	100%				31	S
Interior do Estado	São Caetano do Sul*	-	-	-	-	-	-
	Taboão da Serra	100%				31	S
	Campinas-Centro	100%				31	S
	Ribeirão Preto	100%				29	S
	S.José Campos-Jd.Satélite	100%				23	S

N = Número de dias válidos

Repr. = Atende ao critério de representatividade mensal dos dados : S (sim) e N (não)

* Dados indisponíveis devido a questões operacionais

Dióxido de enxofre - SO₂



É um gás incolor, resultante principalmente da queima de combustíveis que contêm enxofre, como óleo diesel, óleo combustível industrial e gasolina. É um dos principais precursores da chuva ácida e também responsável pela formação de sulfatos secundários que contribuem para a formação do material particulado na atmosfera.


Dióxido de Enxofre (SO ₂) - Outubro 2025									
Estação		Qualidade e faixa de concentração (média de 24h)					Conc. Média Mensal ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	N	Repr.
		Boa 0 - 20 $\mu\text{g}/\text{m}^3$	Moderada >20 - 40 $\mu\text{g}/\text{m}^3$	Ruim >40 - 365 $\mu\text{g}/\text{m}^3$	Muito Ruim >365 - 800 $\mu\text{g}/\text{m}^3$	Péssima >800 $\mu\text{g}/\text{m}^3$			
RMSP	Cerqueira César	100%					1	27	S
	Congonhas	100%					2	30	S
	Guarulhos-Pimentas	100%					2	31	S
	Interlagos	100%					1	9	N
	Marg.Tietê-Ponte dos Remédios	100%					2	29	S
	Osasco	100%					2	22	S
	S.André-Capuava	100%					4	29	S
Interior e Litoral do Estado	São Caetano do Sul*	-	-	-	-	-	-	-	-
	Cubatão-Centro	100%					4	31	S
	Cubatão-Vale do Mogi	100%					5	30	S
	Cubatão-Vila Parisi	84%	3%	13%			13	31	S
	Paulínia	100%					3	31	S
	Paulínia-Sta Terezinha	100%					2	25	S
	S.José Campos	100%					2	31	S
	Santos-Ponta da Praia	100%					2	31	S

N = Número de dias válidos

Repr. = Atende ao critério de representatividade mensal dos dados : S (sim) e N (não)

* Dados indisponíveis devido a questões operacionais

Dióxido de nitrogênio - NO₂



Os óxidos de nitrogênio (NO_x) são lançados na atmosfera durante processos de combustão, envolvendo veículos automotores ou processos industriais. O NO sob a ação de luz solar se transforma em NO₂ que, além de ser um dos poluentes considerados prioritários para a medição, tem papel importante na formação de oxidantes fotoquímicos como o ozônio.


Dióxido de Nitrogênio (NO ₂) - Outubro 2025								
Estação	Qualidade e faixa de concentração (máxima média de 1h)					Conc. Média Mensal ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	N	Repr.
	Boa 0 - 200 $\mu\text{g}/\text{m}^3$	Moderada >200 - 240 $\mu\text{g}/\text{m}^3$	Ruim >240 - 320 $\mu\text{g}/\text{m}^3$	Muito Ruim >320 - 1130 $\mu\text{g}/\text{m}^3$	Péssima >1130 $\mu\text{g}/\text{m}^3$			
RMSP	Cerqueira César	100%				33	30	S
	Congonhas	100%				65	24	S
	Guarulhos-Pimentas	100%				23	31	S
	Ibirapuera	100%				27	31	S
	Interlagos	100%				24	31	S
	Itaim Paulista	100%				24	31	S
	Marg.Tietê-Ponte dos Remédios	100%				47	21	S
	Osasco	100%				50	22	S
	Parque D.Pedro II	100%				32	20	N
	Pico do Jaraguá	100%				17	30	S
	Pinheiros	100%				31	20	N
	S.André-Capuava	100%				21	30	S
	S.Bernardo-Centro	100%				22	31	S
	São Caetano do Sul*	-	-	-	-	-	-	-
Interior e Litoral do Estado	Araraquara	100%				15	30	S
	Bauru	100%				15	8	N
	Campinas-Taquaral	100%				13	30	S
	Catanduva	100%				16	31	S
	Cubatão-Centro	100%				26	22	S
	Cubatão-Vale do Mogi	100%				44	27	S
	Cubatão-Vila Parisi	100%				48	24	S
	Guaratinguetá	100%				12	31	S
	Jacareí	100%				11	28	S
	Jaú	100%				11	31	S
	Jundiaí	100%				27	31	S
	Limeira	100%				21	31	S
	Marília	100%				13	31	S
	Paulínia	100%				20	31	S
	Paulínia-Sta Terezinha	100%				26	22	S
	Piracicaba	100%				21	22	S
	Presidente Prudente	100%				10	31	S
	Ribeirão Preto	100%				16	30	S
	S.José Campos	100%				19	7	N
	S.José Campos-Jd.Satélite	100%				15	31	S
	Santa Gertrudes	100%				29	31	S
	Santos-Ponta da Praia	100%				22	31	S
	São José do Rio Preto	100%				20	7	N
	Sorocaba	100%				15	31	S
	Tatuí	100%				8	30	S
	Taubaté	100%				11	30	S

N = Número de dias válidos

Repr. = Atende ao critério de representatividade mensal dos dados : S (sim) e N (não)

* Dados indisponíveis devido a questões operacionais

Compostos de enxofre reduzido - ERT



Os compostos de enxofre reduzido (ERT) mais frequentes e abundantes são: sulfeto de hidrogênio (H_2S), metil-mercaptana (CH_3SH), dimetil-sulfeto ($(CH_3)_2S$) e dimetil-dissulfeto ($(CH_3)_2S_2$). São emitidos por processos industriais diretamente para atmosfera, além de ser também resultado da degradação anaeróbica de matéria orgânica em corpos hídricos. Esses compostos se caracterizam pela sensação de odor desagradável, mesmo em baixa concentração, podendo ocasionar incômodos à população.

Enxofre Reduzido Total (ERT) - Outubro/2025								
Estação		Faixa de concentração (média horária)					Nh	Repr.
		< 5 ppb	>5 – 30 ppb	>30 – 100 ppb	>100 – 200 ppb	>200 ppb		
RMSp	Marginal Tietê - Ponte dos Remédios	93,00%	7,00%	0,00%			414	N
Interior	Americana	91,37%	7,21%	1,42%			707	S


Nh = Número de medidas horárias válidas

Repr. = Atende ao critério de representatividade mensal dos dados : S (sim) e N (não)

No Brasil não há padrão de qualidade do ar para ERT. Não existe limite de percepção de odor para os compostos de enxofre reduzido total como um todo, e sim para seus componentes individuais. O limite de percepção de odor para H_2S é de 5 ppb, por outro lado algumas mercaptanas possuem limites de percepção de odor ainda menores. Há vários fatores que afetam a sensibilidade ao odor, sendo que mesmo com concentrações de 30 ppb de H_2S (padrão de qualidade do ar adotado na Califórnia, EUA) ainda uma parcela da população não detectaria o odor¹.

¹ *The Perception of Hydrogen Sulfide Odour in Relation to Setting an Ambient Air Quality Standard – Final Report Prepared for California Air Resources Board ARB Contract A4-046-33, April 1985*

Benzeno e Tolueno



Benzeno e Tolueno são compostos orgânicos voláteis provenientes em grandes centros urbanos, principalmente, das emissões de veículos a gasolina. O benzeno também pode ser emitido em atividades industriais e é utilizado na manufatura de alguns produtos químicos como detergentes, tintas, pigmentos, etc. O Brasil não possui padrão de qualidade do ar para esses poluentes.

Benzeno - Outubro/2025 (média horária)								
Estação		Faixa de concentração					Nh	Repr.
		< 2 µg/m³	>2 – 5 µg/m³	>5 – 10 µg/m³	>10 - 20 µg/m³	>20 µg/m³		
RMSP	Pinheiros*	-	-	-	-	-	-	-
	Santo André-Capuava	53,75%	18,06%	11,45%	10,57%	6,17%	227	N
Interior e Litoral do Estado	Cubatão-Centro*	-	-	-	-	-	-	-
	Paulínia	95,02%	2,99%	1,49%	0,50%		201	N
	São José dos Campos	97,31%	2,55%	0,14%			744	S
	São José dos Campos - Vista Verde	88,17%	11,18%	0,65%			617	S

Nh = Número de medidas horárias válidas

Repr. = Atende ao critério de representatividade mensal dos dados : S (sim) e N (não)

* Dados indisponíveis devido a questões operacionais


Tolueno - Outubro/2025 (média horária)								
Estação		Faixa de concentração					Nh	Repr.
		<6 µg/m³	>6 – 15 µg/m³	>15 – 30 µg/m³	>30 - 60 µg/m³	>60 µg/m³		
RMSP	Pinheiros*	-	-	-	-	-	-	-
	Santo André-Capuava	43,17%	30,84%	14,10%	11,89%		227	N
Interior e Litoral do Estado	Cubatão-Centro*	-	-	-	-	-	-	-
	Paulínia	97,51%	1,49%	0,50%	0,50%		201	N
	São José dos Campos	84,14%	14,65%	1,08%	0,13%		744	S
	São José dos Campos - Vista Verde	79,26%	18,96%	1,78%			617	S

Nh = Número de medidas horárias válidas

Repr. = Atende ao critério de representatividade mensal dos dados : S (sim) e N (não)

* Dados indisponíveis devido a questões operacionais

Aldeídos



Os aldeídos são emitidos diretamente para a atmosfera por diversas fontes, das quais se destacam os veículos automotores e processos industriais, e podem também ser formados na atmosfera por meio de reações químicas. São também precursores de ozônio. Não há padrão nacional de qualidade do ar.

Aldeídos - Outubro/2025					
Estação Congonhas (RMSP)	Concentração média de 24h (ppb)				
	03/out	09/out	15/out	21/out	27/out
Acetaldeído	2,8	2,4	2,7	2,1	3,4
Formaldeído	3,5	2,4	3,1	2,2	3,3

Ocorrências nas Redes de Monitoramento

Rede Automática

- Estação S.Bernardo-Paulicéia desativada definitivamente.

Rede Manual

- Estação São Bernardo do Campo desativada definitivamente.

© CETESB 2025

Os dados estão sujeitos a alterações por validações posteriores.

O uso das informações contidas nesse boletim é de inteira responsabilidade do usuário.

É permitida a reprodução total ou parcial deste documento, desde que citada a fonte.