

PORTARIA IBAMA Nº 1.522, DE 19 DE DEZEMBRO 1989

(Já retificada pela Portaria IBAMA nº 221/90)

Dispõe sobre a Lista Oficial de Espécies da Fauna Brasileira Ameaçada de Extinção.

O PRESIDENTE DO INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS - IBAMA, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela Lei nº 7.735, de 22 de fevereiro de 1989, publicada no Diário Oficial da União, de 23 de fevereiro de 1989,

RESOLVE:

Art. 1º . Como Lista Oficial de Espécies da Fauna Brasileira Ameaçada de Extinção, a seguinte relação:

1.0 - MAMMALIA

1.1 - PRIMATES

- * *Alouatta belzebul belzebul* (Linnaeus, 1766). Família CEBIDAE. Nome popular: guariba.
- * *Alouatta fusca* (E. Geoffroy, 1812). Família CEBIDAE. Nome popular: barbado, guariba.
- * *Ateles belzebuth* (E. Geoffroy, 1806). Família CEBIDAE. Nome popular: macaco-aranha.
- * *Ateles paniscus* (Linnaeus, 1758). Família CEBIDAE. Nome popular: macaco-aranha.
- * *Brachyteles arachnoides* (E. Geoffroy, 1806). Família CEBIDAE. Nome popular: muriqui, mono-carvoeiro.
- * *Cacajao calvus* (L. Geoffroy, 1847). Família CEBIDAE. Nome popular: uacari.
- * *Cacajao melanocephalus* (Humboldt, 1812). Família CEBIDAE. Nome popular: uacari-preto.
- * *Callicebus personatus* (E. Geoffroy, 1812). Família CEBIDAE. Nome popular: guigó, sauá.
- * *Callimico goeldii* (Thomas, 1904). Família CALLIMICONIDAE. Nome popular: calimico.
- * *Callithrix argentata leucippe* (Thomas, 1922). Família CALLITRICHIDAE. Nome popular: sagui.
- * *Callithrix aurita* (Hulboldt, 1812). Família CALLITRICHIDAE. Nome popular: sagui-de-serra-escuro.
- * *Callithrix flaviceps* (Thomas, 1903). Família CALLITRICHIDAE. Nome popular: sagui-da-serra.
- * *Callithrix humeralifer* (E. Geoffroy, 1812). Família CALLITRICHIDAE. Nome popular: sagui.
- * *Cebus apella xanthosternos* (Wied, 1820). Família CEBIDAE. Nome popular: macaco-prego-do-peito-amarelo.
- * *Chiropotes albinasus* (L. Geoffroy & Daville, 1848). Família CEBIDAE. Nome popular: cuxiu-de-nariz-branco.
- * *Chiropotes satanas utahicki* (Hershkovitz, 1985). Família CEBIDAE. Nome popular: cuxiu.
- * *Chiropotes satanas satanas* (Hoffmannesegg, 1807). Família CEBIDAE. Nome popular: cuxiu.
- * *Lagothrix lagotricha* (Humboldt, 1812). Família CEBIDAE. Nome popular: barrigudo.
- * *Leontopithecus chrysomelas* (Kubl, 1620). Família CALLITRICHIDAE. Nome popular: mico-leão-de-cara-dourada.
- * *Leontopithecus chrysopygus* (Myan, 1823). Família CALLITRICHIDAE. Nome popular: mico-leão-preto.
- * *Leontopithecus rosalia* (Linnaeus, 1766). Família CALLITRICHIDAE. Nome popular: mico-leão-dourado, sagui-piranga.
- * *Pithecia albicans* (Gray, 1860). Família CEBIDAE. Nome popular: parauacú-branco.
- * *Saguinus bicolor* (Spix, 1823). Família CALLITRICHIDAE. Nome popular: soim-de-coleira.
- * *Saguinus imperator* (Goeldi, 1907). Família CALLITRICHIDAE. Nome popular: sagui-bigodeiro.
- * *Saimiri vanzolinii* (Ayres, 1985). Família CEBIDAE. Nome popular: mico-de-cheiro.

1.2 - CARNIVORA

- * *Atelicynus microtis* (Sclater, 1883). Família CANIDAE. Nome popular: cachorro-do-mato-de-orelha-curta.
- * *Chrysocyon brachyurus* (Illiger, 1815). Família CANIDAE. Nome popular: lobo-guará, lobo-vermelho.
- * *Felis colocolo* (Molina, 1810). Família FELIDAE. Nome popular: gato-palheiro.
- * *Felis concolor* (Linnaeus, 1771). Família FELIDAE. Nome popular: sussuarana, onça-parda.
- * *Felis geoffroyi* (d'Orbigny & Gervais, 1844). Família FELIDAE. Nome popular: gato-do-mato.
- * *Felis pardalis* (Linnaeus, 1758). Família FELIDAE. Nome popular: jaguatirica.
- * *Felis tigrina* (Schreber, 1775). Família FELIDAE. Nome popular: gato-do-mato.
- * *Felis wiedii* (Schinz, 1921). Família FELIDAE. Nome popular: gato-do-mato, maracajá.
- * *Grammogale africana* (Demarest, 1818). Família MUSTELIDAE. Nome popular: doninha-amazônica.
- * *Lutra longicaudis* (Olfers, 1818). Família MUSTELIDAE. Nome popular: lontra.

* *Panthera onça* (Linnaeus, 1758). Família FELIDAE. Nome popular: onça-pintada, pintada, canguçu, onça-canguçu, jaguar-canguçu.

* *Pteronura brasiliensis* (Gmelin, 1788). Família MUSTELIDAE. Nome popular: ariranha.

* *Speothos venaticus* (Lund, 1842). Família CANIDAE. Nome popular: cachorro-do-mato-vinagre.

1. 3 - XENARTHRA

* *Bradypus torquatus* (Desmarest, 1816). Família BRADYPODIDAE. Nome popular: preguiça-de-coleira.

* *Myrmecophaga tridactyla* (Linnaeus, 1758). Família MYMERCOPHAGIDAE. Nome popular: tamanduá-bandeira.

* *Priodontes maximus* (Kerr, 1792). Família DASYPODIDAE. Nome popular: tatu-canastra, tatuçu.

* *Tolypeutes tricinctus* (Linnaeus, 1758). Família DASYPODIDAE. Nome popular: tatu-bola, tatuapara.

1. 4 - SIRENIA

* *Trichechus inunguis* (Natterer, 1883). Família TRICHECHIDAE. Nome popular: peixe-boi, guarabá.

* *Trichechus manatus* (Linnaeus, 1758). Família TRICHECHIDAE. Nome popular: peixe-boi, peixe-boi-marinho, manati.

1. 5 - CEATACEA

* *Eubalena australis* (Desmoulins, 1822). Família BALAENIDAE. Nome popular: baleia-franca, baleia-franca-austral.

* *Megaptera novaeangliae* (Borowaki, 1781). Família BALAENOPTERIDAE. Nome popular: jubarte.

* *Potonporia blainvillei* (Gervais & d'Orbigny, 1844). Família PONTOPORIDAE. Nome popular: toninho, boto-cachimbo.

1. 6 - RODENTIA

* *Abrawayaomys ruschii* (Cunha & Cruz, 1979). Família CRICETIDAE.

* *Chaetomys subspinosus* (Olfers, 1818). Família ERETHIZONTIDAE. Nome popular: ouriço-preto.

* *Juscelinomys candango* (Moojen, 1965). Família CRICETIDAE.

* *Kunsia tomentosus* (Lichtenstein, 1830). Família CRICETIDAE.

* *Phaenomys ferrugineus* (Thomas, 1894). Família CRICETIDAE. Nome popular: rato-do-mato-ferrugíneo.

* *Rhagomys rufescens* (Thomas, 1886). Família CRICETIDAE. Nome popular: rato-do-mato-laranja.

1. 7. ARTIODACTYLA

* *Blastocercus dichotomus* (Illiger, 1815). Família CERVIDAE. Nome popular: cervo-do-pantanal.

* *Odocoileus virginianus* (Zimmermann, 1780). Família CERVIDAE. Nome popular: caribau.

* *Ozotocercus bezoarticus* (Linnaeus, 1758). Família CERVIDAE. Nome popular: veado-campeiro.

2. 0 - AVES

2. 1 - TINAMIFORMES

* *Crypturellus noctivagus* (Wied, 1820). Família TINAMIDAE. Nome popular: jão-do-sul, zabelê, juó.

* *Nothura minor* (Spix, 1825). Família TINAMIDAE. Nome popular: codorna-mineira, codorna-buraqueira, buraqueira.

* *Taoniscus nanus* (Tomminck, 1815). Família TINAMIDAE. Nome popular: codorna-buraqueira, perdigão, inhambú-carapé.

* *Tinamus solitarius* (Vieillot, 1819). Família TINAMIDAE. Nome popular: macuco, macuca.

2. 2 - CICONIIFORMES

* *Eudocimus ruber* (Linnaeus, 1758). Família THRESKIORNITHIDAE. Nome popular: guará.

* *Tigrisoma fasciatum fasciatum* (Such, 1825). Família ARDEIDAE. Nome popular: socó-boi.

2.3 - PHOENICOPTERIFORMES

* *Phoenicopterus ruber* (Linnaeus, 1758). Família PHOENICOPTERIDAE. Nome popular: ganso-do-norte, ganso-cor-de-rosa, maranhão, flamingo.

2. 4 - ANSERIFORMES

* *Mergus octosetaceus* (Vieillot, 1817). Família ANATIDAE. Nome popular: mergulhão, patão, pato-mergulhão.

2. 5 - FALCONIFORMES

* *Accipiter poliogaster* (Temminck, 1824). Família ACCIPITRIDAE. Nome popular: tauató-pintado, gavião-pombo-grande.

* *Falco deiroleucus* (Temminck, 1825). Família FALCONIDAE. Nome popular: falcão-de-peito-vermelho.

* *Harpia harpyja* (Linnaeus, 1758). Família ACCIPITRIDAE. Nome popular: gavião-real, gavião-de-penacho, uiraçu-verdadeiro, cutucurim, harpia.

* *Harpohaliaetus coronatus* (Vieillot, 1817). Família ACCIPITRIDAE. Nome popular: águia-cinzenta.

* *Leucopternis lacemulata* (Temminck, 1827). Família ACCIPITRIDAE. Nome popular: gavião-pomba.

* *Leucopternis polionota* (Kaup, 1847). Família ACCIPITRIDAE. Nome popular: gavião-pomba.

* *Morphnus guianensis* (Daudin, 1800). Família ACCIPITRIDAE. Nome popular: gavião-de-penacho, uiraçu-falso.

* *Spizastur melanoleucus* (Vieillot, 1816). Família ACCIPITRIDAE. Nome popular: gavião-preto, apacamim, gavião-pato.

2. 6 - GALLIFORMES

* *Crax blumberbachii* (Spix, 1825). Família CRACIDAE. Nome popular: mutum-do-sudeste.

* *Crax fasciolata pinima* (Pelzein, 1870). Família CRACIDAE. Nome popular: Mutum-de-penacho, mutum-pinima.

* *Mitu mitu mitu* (Linnaeus, 1766). Família CRACIDAE. Nome popular: mutum-cavalo, mutum-êtê, mutum-da-várzea, mutum-piry, mutum-do-nordeste.

* *Penelope jacucaca* (Spix, 1825). Família CRACIDAE. Nome popular: jacucaca.

* *Penelope obscura bronzina* (Hellmayr, 1914). Família CRACIDAE. Nome popular: jacoguossu, jacuaçu.

* *Penelope ochrogaster* (Pelzein, 1870). Família CRACIDAE. Nome popular: jacu-de-barriga-castanha.

* *Pepile jacutinga* (Spix, 1825). Família CRACIDAE. Nome popular: jacutinga.

2. 7 - CHARADRIIFORMES

* *Numenius borealis* (Forator, 1772). Família SCOLOPACIDAE. Nome popular: maçarico-esquimó.

2. 8 - COLUMBIFORMES

* *Claravis godefrida* (Temminck, 1811). Família COLUMBIDAE. Nome popular: pararu, pomba-de-espelho.

* *Columbina cyanopis* (Pelzein, 1870). Família COLUMBIDAE. Nome popular: rolinha-de-planalto, rolinha-do-Brasil-central.

2. 9 - PSITTACIFORMES

* *Amazona brasiliensis* (Linnaeus, 1758). Família PSITTACIDAE. Nome popular: papagaio-de-cara-roxa, chauá.

* *Amazona pretrei* (Temminck, 1830). Família PSITTACIDAE. Nome popular: chorão, charão, papagaio-da-serra, serrano.

* *Amazona rhodocorytha* (Salvatori, 1890). Família PSITTACIDAE. Nome popular: chauá-verdadeiro, jauá, acumatanga, camutanga.

* *Amazona vinacea* (Kuhl, 1820). Família PSITTACIDAE. Nome popular: papagaio-de-peito-roxo, papagaio-caboclo, papagaio-curraleiro, jurueba.

* *Anodorhynchus glaucus*(*) (Vieillot, 1816). Família PSITTACIDAE. Nome popular: arara-azul-pequena.

* *Anodorhynchus hyacinthinus* (Lalham, 1720). Família PSITTACIDAE. Nome popular: arara-azul-de-lear-grande, araraúna.

* *Anodorhynchus leari* (Bonaparte, 1857). Família PSITTACIDAE. Nome popular: arara-azul-de-lear.

* *Aratinga guarouba* (Gmelin, 1877). Família PSITTACIDAE. Nome popular: guaruba, ararajuba.

* *Cyanopsitta spixii* (Wagler, 1832). Família PSITTACIDAE. Nome popular: ararinha-azul.

* *Pyrihura cruentata* (Wied, 1820). Família PSITTACIDAE. Nome popular: tiriba, fura-mato, cara-suja.

* *Pyrihura leucotis* (Kuhl, 1820). Família PSITTACIDAE. Nome popular: fura-pato, tiriba-de-orelha-branca.

* *Touit melanonota* (Wied, 1820). Família PSITTACIDAE. Nome popular: apuim-de-cauda-vermelha.

* *Touit surda* (Kuhl, 1820). Família PSITTACIDAE. Nome popular: apuim-de-cauda-amarela.

* *Tricharia malachitacea* (Spix, 1824). Família PSITTACIDAE. Nome popular: sabiá-cica, araqu-aíava.

2. 10. CUCULIFORMES

* *Neomorphus geoffroyi dulcis* (Sneath, 1927). Família CUCULIDAE. Nome popular: aracuão, jacu-molambo, jucu-porco, jacu-verde, jacu-taquara.

* *Neomorphus geoffroyi geoffroyi* (Temminck, 1820). Família CUCULIDAE. Nome popular: jacu-estalo.

2. 11 - CAPRIMULGIFORMES

* *Caprimulgus candicans* (Pelzeln, 1867). Família CAPRIMULGIDAE. Nome popular: bacurau, rato-branco.

* *Eleothreptus anomalus* (Gould, 1837). Família CAPRIMULGIDAE. Nome popular: curiangu-do-banhado.

* *Macropsalis creagra* (Bonaparte, 1850). Família CAPRIMULGIDAE. Nome popular: bacurau, tesoura-gigante.

* *Nyctibius leucopterus* (Wied, 1821). Família NYCTIBIIDAE. Nome popular: mãe-da-lua.

2. 12 - APODIFORMES

* *Phaethomis superciliosus margaretae* (Ruschi, 1972). Família TROCHILIDAE. Nome popular: besourão-de-rabo-branco.

* *Ranphodon dohrnii* (Boucier & Mulsant, 1852). Família TROCHILIDAE. Nome popular: balança-rabo-canela, beila-flor-de-Dohm, besourão.

2. 13 - PICIFORMES

* *Campephylus robustus* (Lichtenstein, 1819). Família PICIDAE. Nome popular: pica-pau-rei.

* *Celeus torquatus tinnunculus* (Wagler, 1829). Família PICIDAE. Nome popular: pica-pau-de-coleira.

* *Dryocopus galeatus* (Temminck, 1822). Família PICIDAE. Nome popular: pica-pau-de-cara-amarela.

* *Jacamaralcyon tridactyla* (Vieillot, 1817). Família GALBULIDAE. Nome popular: cuitelão, bicudo, violeiro.

2. 14 - PASSERIFORMES

* *Amaurospiza moesta* (Hartlaub, 1853). Família EMBERIZIDAE. Nome popular: negrinho-do-mato.

* *Alecrituros risoria* (Vieillot, 1824). Família TYRANNIDAE. Nome popular: galito, tesoura-de-campo, bandeira-do-campo.

* *Anthus nattereri* (Sclater, 1878). Família MOTTACILLIDAE. Nome popular: caminheiro-grande.

* *Calyptura cristata*(*) (Vieillot, 1818). Família CONTINGIDAE. Nome popular: tietê-de-coroa.

* *Carduelis yarrellii* (Audubon, 1839). Família EMBERIZIDAE. Nome popular: coroinha, pintassilgo-do-nordeste.

* *Carpornis melanocephalus* (Wied, 1820). Família CONTINGIDAE. Nome popular: sabiá-pimenta.

* *Cercomacra carbonaria* (Sclater & Salvin, 1873). Família FORMICARLIDAE.

* *Clibanornis dendrocolaptoides* (Pelzeln, 1859). Família FURNARIIDAE.

* *Conothraupis mesoleuca* (Berlioz, 1939). Família ENERIZIDAE.

* *Cotinga maculata* (Müller, 1776). Família COTINGIDAE. Nome popular: crejoá, quiruá, catingá.

* *Culioivora caudacuta* (Vieillot, 1818). Família TYRANNIDAE. Nome popular: papa-moscas-do-campo.

* *Curaeus forbesi* (Sclater, 1886). Família ICTERIDAE. Nome popular: anumará.

* *Daonis nigripes* (Pelzeln, 1856). Família EMBERIZIDAE. Nome popular: saí-de- pernas-pretas.

* *Formicivora erythronotos* (Hartlaub, 1852). Família FORMICARIIDAE.

* *Formicivora iheringi* (Hellmayr, 1909). Família FORMICARIIDAE. Nome popular: papa-formiga.

* *Gubernatrix cristata* (Vieillot, 1817). Família EMBERIZIDAE. Nome popular: cardeal-amarelo.

* *Hemitriccus aenigma* (Zimmer, 1940). Família TYRANNIDAE.

* *Hemitriccus furcatus* (Lafresnaye, 1846). Família TYRANNIDAE. Nome popular: papa-moscas-estrela.

* *Hemitriccus kaempferi* (Zimmer, 1953). Família TYRANNIDAE.

* *Herpsilochmus pectoralis* (Sclater, 1857). Família FORMICARIIDAE.

* *Lodopleuta pipra* (Lesson, 1831). Família COTINGIDAE. Nome popular: anambezinho.

* *Lipaugus lanioides* (Lesson, 1844). Família COTINGIDAE. Nome popular: sabiá-da-mata-virgem, sabiá-do-mato-grosso, sabiá-da-serra, virussu, tropeiro-da-serra.

* *Megaxenops parnaguae* (Reiser, 1905). Família FURNARIIDAE. Nome popular: bico-virão-de-catinga.

* *Merulaxis stresemanni* (Sick, 1960). Família RHINOCHYPTIDAE.

* *Myadestes leucogenys* (Cabanis, 1851). Família TURDIDAE. Nome popular: sabiá-castanho.

* *Mirmeciza ruficauda* (Wied, 1831). Família FORMICARIIDAE.

* *Mirmeciza stictothorax* (Todd, 1927). Família FORMICARIIDAE.

* *Mymotherula minor* (Salvatoti, 1867). Família FORMICARIIDAE. Nome popular: choquinha.

* *Neimosia rourei* (Cabanis, 1870). Família EMBERIZIDAE. Nome popular: saira-apunhalada.

* *Oryzorobus maximiliani* (Cabanis, 1851). Família EMBERIZIDAE. Nome popular: bicudo, bicudo-verdadeiro, bicudo-preto.

* *Phibaiura flavirostris* (Vieillot, 1816). Família COTINGIDAE. Nome popular: tesourinha.

- * *Phylloscartes ceciliae* (Teixeira, 1987). Família TYRANNIDAE.
- * *Phylloscartes roquettei* (Shethiage, 1928). Família TYRANNIDAE.
- * *Philydor novaesi* (Teixeira & Gonzaga, 1983). Família FURNARIIDAE.
- * *Piprites pileatus* (Temminck, 1822). Família COTINGIDAE. Nome popular: cameleirinho-de-chapéu-preto.
- * *Platyrinchus leucoryphus* (Wied, 1831). Família TYRANNIDAE. Nome popular: patinho-gigante.
- * *Poecilurus Kollari* (Pelzein, 1856). Família FURNARIIDAE.
- * *Poospiza cinerea* (Bonaparte, 1850). Família EMBERIZIDAE. Nome popular: andorinha-do-oco-do-pau, capacetinho-do-oco-do-pau.
- * *Procnias averano averano* (Illermann, 1783). Família COTINGIDAE. Nome popular: araponga-do-nordeste, guiraponga.
- * *Pyriglena atra* (Swainson, 1625). Família FORMICARIIDAE. Nome popular: papa-formigas.
- * *Pyroderus scutatus scutatus* (Shaw, 1792). Família COTINGIDAE. Nome popular: pavoá, pavão, pavó, pavão-do-mato.
- * *Rhopornis ardesiaca* (Wied, 1831). Família FORMICARIIDAE. Nome popular: papa-formigas-de-gravatá.
- * *Scytalopus novacapitalis* (Sick, 1958). Família RHINOCRYPTIDAE.
- * *Sporophila falcirostris* (Temminck, 1820). Família EMBERIZIDAE. Nome popular: papa-capim, cigarra-verdadeira.
- * *Sporophila frontalis* (Verreaux, 1869). Família EMBERIZIDAE. Nome popular: pichochó, papa-arroz.
- * *Sporophila palustris* (Barrows, 1883). Família EMBERIZIDAE. Nome popular: caboclinho-de-papo-branco.
- * *Sturnella defilippii* (Bonaparte, 1851). Família ICTERIDAE. Nome popular: peito-vermelho-grande.
- * *Synallaxis infuscata* (Pinto, 1950). Família FURNARIIDAE.
- * *Tangara fastuosa* (Lesson 1831). Família EMBERIZIDAE. Nome popular: pintor-verdadeiro.
- * *Terenura sicki* (Teixeira & Gonzaga, 1983). Família FORMICARIIDAE.
- * *Thamnomanes lumbeus* (Wied, 1831). Família FORMICARIIDAE.
- * *Thripophaga macroura* (Wied, 1821). Família FURNARIIDAE. Nome popular: rabo-amarelo.
- * *Xanthopsar flavus* (Gmelin, 1788). Família ICTERIDAE. Nome popular: pássaro-preto-de-haste-amarela.
- * *Xiphocolaptes falcirostris* (Spix, 1824). Família DENDROCOLAPTIDAE. Nome popular: arapaçu-do-nordeste.
- * *Xiphocolaptes franciscanus* (Sneethlage, 1927). Família DENDROCOLAPTIDAE. Nome popular: arapaçu.
- * *Xipholena atropurpurea* (Wied, 1820). Família COTINGIDAE. Nome popular: anambé-de-asa-branca, cotinga, ferrugem.

3. 0 - REPTILIA

3. 1 - CHELONIA

- * *Caretta caretta* (Linnaeus, 1758). Família CHELONIDAE. Nome popular: cabeçauda, tartaruga-meio-pente.
- * *Chelonia mydas* (Linnaeus, 1758). Família CHELONIDAE. Nome popular: tartaruga-verde.
- * *Dermochelys coriacea* (Linnaeus, 1758). Família DERMOCHELYDAE. Nome popular: tartaruga-de-couro, tartaruga-gigante, tartaruga-de-pele.
- * *Eretmochelys imbricata* (Linnaeus, 1766). Família CHELONIDAE. Nome popular: tartaruga-de-pente.
- * *Lepidochelys olivacea* (Enscholtz, 1829). Família CHELONIDAE.
- * *Phrynops hoguei* (Mertens, 1957). Família CHELONIDAE.

3. 2 - SQUAMATA

- * *Lachesis muta rhombeata* (Wied, 1825). Família VIPERIDAE. Nome popular: surucu-pico-do-jaca, surucucu. (((verificar nome correto)))

3. 3 - CROCODILIA

- * *Caiman latirostris* (Daudin, 1802). Família CROCODILIDAE. Nome popular: jacaré-de-papo-amarelo.
- * *Melanosuchus niger* (Spix, 1825). Família CROCODILIDAE. Nome popular: jacaréaçu.

4. 0 - AMPHIBIA

- * *Paratelmatobius gaiageae* (Cochran, 1938). Família LEPTODACTYLIDAE.

5. 0 - INSECTA

5. 1 - LEPIDOPTERA - Borboleta

- * *Dasyophthalma vertebralis*(*) (Butler, 1969). Família NYMPHALIDAE.
- * *Eresia orysice*(*) (Geyer, 1832). Família NYMPHALIDAE.
- * *Eurytides iphitas*(*) (Hubner, 1821). Família PAPILIONIDAE.
- * *Eurytides lysithous harrisianus* (Swainson,1822). Família NYMPHALIDAE.
- * *Eutresis hypereia imeriensis* (Brown, 1977). Família NYMPHALIDAE.
- * *Heliconius nattereei* (Felder&Felder,1865). Família NYMPHALIDAE.
- * *Hyalyris fiammctta*(*) (Hewitson, 1852). Família NYMPHALIDAE.
- * *Hyalyris leptalina leptalina*(*) (Felder & Felder, 1865). Família NYMPHALIDAE.
- * *Hypoleria fallens* (Haensch, 1905). Família NYMPHALIDAE.
- * *Hypoleria mulviana* (D'Almeida, 1958). Família NYMPHALIDAE.
- * *Hypothyris mayl* (D'Almeida, 1945). Família NYMPHALIDAE.
- * *Joiceya praeclara* (Talbot, 1928). Família LICAENIDAE.
- * *Mechanitis bipuncta* (Forbes, 1948). Família NYMPHALIDAE.
- * *Melinaea mnasias* (Hewitson, 1855). Família NYMPHALIDAE.
- * *Huschoneura methymna* (Godart, 1819). Família PIERIDAE.
- * *Napeogenes cyrianassa xanthone* (Bates,1862). Família NYMPHALIDAE.
- * *Orobrossolis orhamentalis* (Stichel, 1906). Família NYMPHALIDAE.
- * *Papilio himeros himeros* (Hopffer, 1866). Família PAPILIONIDAE.
- * *Papilio himeros baia* (Rothschild & Jordan, 1906). Família PAPILIONIDAE.
- * *Papilio zagreus zagreus* (Doubleday, 1847). Família PAPILIONIDAE.
- * *Papilio zagreus neyi* (Niepelt, 1909). Família PAPILIONIDAE.
- * *Papilio zagreus bedoci* (LeCerf, 1925). Família PAPILIONIDAE.
- * *Parides asceanus* (Cramer, 1775). Família PAPILIONIDAE.
- * *Parides lysander mattogrossensis* (Talbot, 1928). Família PAPILIONIDAE.
- * *Perrhybris flava* (Oberthur, 1895). Família PIERIDAE.
- * *Scada Karschina delicata* (Talbot, 1932). Família NYMPHALIDAE.

5. 2 - ODONATA - Libélula

- * *Leptagrion dardanoi* (Santos, 1968). Família COENAGRIONIDAE.
- * *Leptagrion siqueirai* (Santos, 1968). Família COENAGRIONIDAE.
- * *Mecistogaster asticta* (Selys, 1860). Família PSEUDOSTIGMATIDAE.
- * *Mecistogaster pronoti*(*) (Sjoestedl, 1918). Família PSEUDOSTIGMATIDAE.

6. 0 - ONYCHOPHORA

- * *Peripatus acacioi* (Marcus & Marcus, 1955). Família PERIPATIDAE.

7. 0 - CNIDARIA

- * *Millepora nitidae* (Verreill, 1868). Família MILLEPORIDAE. Nome popular: coral-de-fogo.

(*) Espécies provavelmente extintas.

Art. 2º . Os animais constantes desta relação ficam protegidos de modo integral, de acordo com o estabelecido na Lei nº 5.197, de 3 de janeiro de 1967.

Art. 3º . A não observância da presente portaria constitui infração sujeitas as penalidades previstas na Lei nº 5.197, de 3 de janeiro de 1967 e na Lei nº 7.653 de 12 de fevereiro de 1988, sem prejuízo dos dispositivos previstos no Código Penal e demais leis vigentes, com as penalidades nelas consideradas.

Art. 4º . Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, e revoga a Portaria IBDF nº 3.481, de 31 de maio de 1973, e todas as disposições em contrário.